



ACTEMRA[®] tocilizumab

INSTRUCTIONS POUR LA SERINGUE PRÊTE À L'EMPLOI ACTEMRA[®]




Préparation du site d'injection:





- Les sites d'injection recommandés sont le milieu des faces antérieures des deux cuisses et la région du ventre sous le nombril, à l'exclusion d'un cercle de 5 cm autour de ce dernier.
- Nettoyez la peau avec le tampon imbibé d'alcool.
- Laissez sécher la peau pendant environ 10 secondes.

Préparation de la seringue prête à l'emploi:




- Sortez l'emballage du réfrigérateur.
- Retirez la seringue prête à l'emploi de la boîte et laissez-la reposer à température ambiante (15°C à 25°C) pendant au moins 25 à 30 minutes.
- Vérifiez la date de péremption qui figure sur l'emballage et la seringue prête à l'emploi.
- N'utilisez pas le médicament si la solution dans la seringue prête à l'emploi est trouble, contient des particules visibles et n'est pas incolore à jaunâtre.
- Tenez la seringue prête à l'emploi par le cylindre de la seringue et retirez le capuchon de protection de l'aiguille uniquement lorsque la seringue prête à l'emploi est à température ambiante.
- Ne touchez pas l'aiguille. L'aiguille ne doit entrer en contact avec aucune surface. La seringue doit être utilisée dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon de protection de l'aiguille.

Injection du médicament:



- Formez un pli cutané souple au niveau du site d'injection désinfecté.
- D'un mouvement rapide et bref, enfoncez complètement l'aiguille dans le pli cutané selon un angle de 45° à 90°.
- Relâchez le pli cutané.
- Pressez lentement le piston de la seringue pour injecter la totalité de la solution.
- Maintenez le piston enfoncé et retirez l'aiguille de la peau en conservant le même angle que lors de l'insertion de l'aiguille de la seringue prête à l'emploi.
- Dès que vous avez complètement retiré l'aiguille de la peau, vous pouvez relâcher la pression sur le piston, ce qui fait glisser le dispositif de sécurité sur l'aiguille exposée.

Élimination de la seringue prête à l'emploi:



- Jetez la seringue prête à l'emploi usagée et le capuchon de protection de l'aiguille dans un récipient prévu à cet effet.